



Ficha Técnica

FERTILIZANTE ÓRGANICO

BTX® es un fertilizante orgánico líquido corrector de carencias de cobre, echo con cobre acomplexado y Timol (Extracto de Tomillo); que garantiza un adecuado aporte de cobre en la hoja sin crear problemas de fitotoxicidad, prevención y control contra diversos patógenos. Favorece el crecimiento y el desarrollo radicular, floración y el cuajado del fruto.

Fórmula

INGREDIENTE ACTIVO	% en peso
Cobre (Cu)*	4.36%
Extracto de Tomillo	23.00%

(*) En forma de Gluconato de Cobre al 32%

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Arándano, zarzamora, fresa, frambuesa, grosella, vid, kiwi. (SL)	Roya (<i>Pucciniastrum americanum</i>)	1.0-2.0 mL / litro de agua	Iniciar las aplicaciones en los primeros síntomas de la enfermedad, con 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días en un volumen de agua de 600 L/ha.
Frambuesa (SL)	<i>Agrobacterium</i>	1.0-1.5	Aplicaren "drench" directo a la base de la planta una vez comiencen los síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación: 400-600 L/ha
Zarzamora (SL)	Cenicilla " <i>Podosphaera macularis</i> "	1.0-2.0	Aplicar cuando se detecte la presencia de cenicilla con 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días con un volumen de agua de 600 L/ha
Vid (SL)	Oidio " <i>Podosphaera macularis</i> "	1.50-2.0 mL/por litro de agua	Aplicar cuando se detecte la presencia de la enfermedad, con 2 aplicaciones vía foliar a intervalos de 14 días con un volumen de agua de 600 L/ha



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.





Ficha Técnica

FERTILIZANTE ÓRGANICO

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Fresa (SL)	Secadera (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0-2.0	Aplicar Vía sistema de riego cuando se presente el problema. Aplicar vía Drench con un volumen de agua de 400-600 L/ha.
	Peca Roja (<i>Mycosphere</i>) Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0-2.0	Hacer aplicación foliar en cuanto se presente el problema, con una frecuencia de 3 aplicaciones con intervalos de 7 días. Volumen de agua 400 L/ha
Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Berenjena. (SL)	Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas campestris</i>)	1.0-1.5	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días entre cada una de ellas. Utilizar 400 L/ha
	Damping-off	1.0-1.5	Aplicar vía Drench con un volumen de agua de 400-600 L/ha.
Rosal, Crisantemo, Clavel, Gladiola, Tulipán, etc. (SL)	Roya (<i>Puccinia horiana</i>)	200-400 mL en 200 L de agua	Se recomienda iniciar las aplicaciones en los primeros síntomas de la enfermedad, y repetir a intervalos de 7 días.
Ajo, Cebollín, Cebolla, Espárrago. (SL)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri.</i>)	1.0-2.0	Realizar tres aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días entre cada una de ellas, en un volumen de agua de 300-400 L/ha.
	<i>Erwinia carotovora</i>	1.0-2.0	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días entre cada una, iniciando cuando se detecte el problema. Volumen de aplicación: 350-450 L/ha.



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.





Ficha Técnica

FERTILIZANTE ÓRGANICO

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Aguacate (SL)	Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)	1.0-1.5 mL por litro de agua	Realizar 1 aplicación al follaje en cuanto se detecte inicio de problema; de ser necesario Realizar dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.
Limón, Lima, Mandarina, Toronjo, Naranja. (SL)	Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)	1.0-1.5 mL por litro de agua	Realizar 1 aplicación al follaje en cuanto se detecte inicio de problema; de ser necesario realizar dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote. (SL)	Cenicilla (Sphaerotheca fuliginea)	1.0-1.5	Realizar 3 aplicaciones al follaje con un intervalo de 7 días entre cada una de ellas. Volumen de agua: 600 L/ha.



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.





Ficha Técnica

FERTILIZANTE ÓRGANICO

Indicaciones como nutriente

CULTIVO	DOSIS L /HA SUELO	DOSIS L/HA FOLIAR	RECOMENDACIONES
Berries (Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid y Kiwi)	1-2 L	1-2.0	Aplicar cada 15 días después de trasplante hasta el término del cultivo.
Bulbos (Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago y Cebollín)	1-2 L	1-2.0	Aplicar cada 15 días después de trasplante hasta el término del cultivo.
Solanáceas (Berenjena, Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate-tomate rojo-, Papa y Pimiento morrón)	1-2 L	1-2.0	Aplicar cada 15 días después de trasplante hasta el término del cultivo.
Cucurbitáceas (Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía y Chayote)	1-2 L	1-2.0	Aplicar cada 15 días después de trasplante hasta el término del cultivo.
Ornamentales (Rosal, Clavel, Criademo, Gladiola, Tulipán.)	1-2 L	1-2.0	Aplicar cada 15 días después de trasplante hasta el término del cultivo.
Frutales Aguacate, Cítricos, Banano, Papayo.	1-2 L	2-3.0	Aplicar cada 21 días desde floración hasta maduración.



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.

