



Ficha Técnica

INSECTICIDAS

Solak® es un insecticida de nueva generación botánico, obtenido a través de procesos exclusivos de Ingeniería Química molecular utilizados en nuestra tecnología de Hibridación Agrícola® registrada, gracias a ello, Solak® es altamente efectivo para dejar expuestos a insectos plaga, maximizando el efecto de cualquier ingrediente activo, ya sea orgánico o convencional.

Solak® contiene metabolitos secundarios tales como **Eugenol**, Cinamaldehído y otros. Funciona como preventivo y sinergista a dosis baja y como correctivo a dosis alta.

Fórmula

INGREDIENTE ACTIVO

%en peso

Extracto de canela (*Cinnamomum verum*)..... 80 g de Eugenol

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Arándano, zarzamora, fresa, frambuesa, grosella, vid, kiwi. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 588 L de agua/ha.
Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Berenjena. (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	2.0-3.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 500 L de agua/ha.
Rosal, Crisantemo, Clavel, Gladiola, Tulipán, etc. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.0-4.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 800 L de agua/ha.
Aguacate (SL)	Pulgón (<i>Aphididae</i>)	2.0-4.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 21 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 2000 L de agua/ha.



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Biotag
BIOTECNOLOGÍA

Tel. 351 147 1022
www.biotag.com.mx
ventas@biotag.com.mx

Biología
Agriculture For Health®



Ficha Técnica

INSECTICIDAS

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Limón, Lima, Mandarina, Toronjo, Naranja. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.0-4.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 21 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 2000 L de agua/ha.
Ajo, Cebollín, Cebolla, Espárrago. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.0-3.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 400 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote. (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	2.0-3.0	Realizar 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación: 400 L de agua/ha.



Presentación:
12x 1L, 10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.

