

Ficha Técnica

FUNGICIDA



Secadert® es un fungicida-bactericida de nueva generación, a base de cobre, formulado con procesos exclusivos en ingeniería química. Dicha formulación permite que **Secadert®** aporte cobre en las deficiencias de este metal para el metabolismo natural de las plantas, actúa por contacto y es sistémico contra hongos y bacterias; impidiendo e inhibiendo la actividad normal en materia de reproducción.

Los procesos de Hibridación Agrícola® registrada, que se utilizan para la formulación de **Secadert®** auxilian a que se pueda utilizar todo el año en cualquier etapa floral de la planta, haciendo del producto una herramienta muy compatible y versátil para su uso.

Fórmula

INGREDIENTE ACTIVO	% en peso
Sulfato de cobre pentahidratado*: Sulfato de cobre II pentahidratado	12.50
(Equivalente a 136.25 g. de I.A./L a 20°C)	

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Arándano, zarzamora, fresa, frambuesa, grosella, vid, kiwi. (SL)	Mildiu (<i>Peronospora spp.</i>)	1.0 – 2.0	Iniciar las aplicaciones en los primeros síntomas de la enfermedad, con 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días en un volumen de agua de 580 L/ha.
Frambuesa (SL)	<i>Agrobacterium</i>	2.0-3.0	Aplicar en "drench" directo a la base de la planta una vez comiencen los síntomas de la



Presentación:
10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.





Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Zarzamora (SL)	Cenicilla <i>"Podosphaera macularis"</i>	1.0-2.0	enfermedad. Volumen de aplicación: 400-600 L/ha Aplicar cuando se detecte la presencia de cenicilla con 3 aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días con un volumen de agua de 600 L/ha
Vid (SL)	Oidio <i>"Podosphaera macularis"</i>	1.50-2.0 mL/por litro de agua	Aplicar cuando se detecte la presencia de la enfermedad, con 2 aplicaciones vía foliar a intervalos de 14 días con un volumen de agua de 600 L/ha
Fresa (SL)	Secadera (<i>Fusarium oxysporum</i>)	2.0-3.0	Aplicar Vía sistema de riego cuando se presente el problema. Aplicar vía Drench con un volumen de agua de 400-600 L/ha.
	Peca Roja (<i>Mycosphereella</i>) Moho Gris (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.0-2.0	Hacer aplicación foliar en cuanto se presente el problema, con una frecuencia de 3 aplicaciones con intervalos de 7 días. Volumen de agua 400 L/ha
Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Berenjena. (SL)	Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas campestris</i>)	1.0-2.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días entre cada una de ellas. Utilizar 400 L/ha



Presentación:
10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.





Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Rosal, Crisantemo, Clavel, Gladiola, Tulipán, etc. (SL)	Damping-off	1.0-2.0	Aplicar vía Drench con un volumen de agua de 400-600 L/ha.
	Cenicilla (Oidium spp.)	350-500 mL en 200 L de agua	Se recomienda iniciar las aplicaciones en los primeros síntomas de la enfermedad, y repetir a intervalos de 7 días.
Ajo, Cebollín, Cebolla, Espárrago. (SL)	Mancha púrpura (Alternaria porri.)	1.0-2.0	Realizar tres aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días entre cada una de ellas, en un volumen de agua de 300-400 L/ha.
	<i>Erwinia carotovora</i>		Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días entre cada una, iniciando cuando se detecte el problema. Volumen de aplicación: 350-450 L/ha.
Aguacate (SL)	Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)	1.0-2.0 mL por litro de agua	Realizar 1 aplicación al follaje en cuanto se detecte inicio de problema; de ser necesario realizar dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.
Limón, Lima, Mandarina, Toronjo, Naranja. (SL)	Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)	1.0-2.0 mL por litro de agua	Realizar 1 aplicación al follaje en cuanto se detecte inicio de problema; de ser necesario realizar dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.



Presentación:
10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.



Ficha Técnica

FUNGICIDA



Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita,		1.0-2.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje con un intervalo de 7 días entre cada una de ellas.
Sandía, Chayote. (SL)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)		Volumen de agua: 600 L/ha.



Presentación:
10.0L y 20.0L

Certificaciones del producto.

